

فواكه

الفواكه

Fragaria

يجمع صنف Fragaria حوالي عشرين نوعاً.
الفواكه ذات عمر بزغ من أجل تمارها تنتشر نبات الفراولة عن طريق الساقين الراحتة. وطابعها الدائم يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة لعدة سنوات. على الرغم من أن الأذاج المائي هو الاختان السنوي أو كل سنتين.

تنسم الدورة الخضرية 300 يوم. وتوضح لنا بعض البيانات التاريخية أن مقاومة بالغ العيد من الخضروات تعتبر الفراولة من المقاصل الحديثة نسبياً. وتقى اكتشافه في الجزائر عام 1905 من قبل الإيطاليين في مدينة سكيدا. عث زراعتها على تلال منطقة ستورا، وأطلق عليها RUSSICADA في عام 1994.

الإنتاج في الجزائر مثل: 309,889 قنطرار (خت الصوب).
309,889 قنطرار الزراعة في الحقل.

منطقة الإنتاج: موزعة بشكل رئيسي في ولايات شمال البلاد (جيجل - تبازة - الجزائر - بومرداس).

أكبر الأصناف المروعة في الجزائر:
دوغلاس، شنادرل، كاماروس، سيلفا، تودلا، روسيكاذا، كوندونجا.

التوت أو العليق (Rubus): ثمرة صالحة للأكل ينتمي لها عدد من الأنواع النباتية من جنس العليق من الفصيلة الوردية.
الاسم يطلق أيضاً على هذه النباتات نفسها بفرق بين التوت والعليق أن التوت شجرة كبيرة بدون أشواك أما العليق فهو شجيرة شائكة متسلقة يصل ارتفاعها إلى مترين.

نبات بردي دغلي شائك متسلق فرعاء متولدة يصل ارتفاعها إلى مترين أو رفقة أوراقها إلى مترين
وتماره حمراء وسوداء مركبة، بينما حول الأنثر.

المواطن الطبيعية:
تمارها تشكل وستعمل أوراقها في علاجات الطب الشععية إذ يستعمل كفابض. منق ويستعمل عصير الأفغان.

الخاصة للأذاج: كما تفيد القرعة في علاج أمراض الفم.
الأنواع الشائعة: العليق الأحمر، العليق الأسود والعليق الأمريكي.

Fruits

Strawberry

The genus *Fragaria* brings together about twenty species.
Strawberry is a perennial plant, cultivated for its fruit propagated by runners; its perennial character allows it to survive for several years, although currently the trend is annual or biennial production.
The vegetative cycle lasts 300 days.

Compared to many vegetables, the strawberry is a relatively recent crop. Some historical data show us that the wood strawberry was cultivated already around the XIX century in Africa and America, it was introduced in Algeria in 1905 by the Italians in level of Skikda, cultivated on the hills of the Stora area, and it was nicknamed RUSSICADA in 1994.
Production in Algeria represents: 309,889 Qx (Under serre), 137,950 Qx (Plein champ).

Potential production areas: distributed mainly in the wilayas of the north of the country (Jijel-Tipaza-Alger-Boumerdes-Blida-Mostaganem and Skikda).

The most cultivated varieties in Algeria: Tioga, Douglas, Chandler, Camarosa, Selva, Toudla, Russicada, Condonga.

Blackberry

Raspberries or blackberries (*Rubus*): An edible fruit produced by a number of plant species of the genus Blackberries of the pink family. The difference between the raspberries and the mûres is that the raspberries are a large tree without thorns and blackberries are a thorny, climbing shrub up to two (02) meters high.

Botanical description: A wild, thorny bush plant with an extended stem, a drooping branch up to a height of two meters, its leaves are oval in shape, combined with white flowers and red and black fruits, compound, that grows around rivers.

Medicinal benefits: Its fruits are eaten and its leaves are used in folk medicine treatments, as it is used as an astringent, purifier and juicy mouthfuls are used for the pain of wounds. Gargling is also useful in treating oral diseases.

Common species: Red Blackberries, Black Blackberries and American Blackberries.

ΣΧΟΛΕΙΟ

Tabya_ tizwelt n uqumi

Tabya d imyi i d-yettaken atas n yigumma (lafaya), tmeqqi s yizurun-ines i yettnerin deg wakal d ayen itt-yeggan ad

tidir atas n yiseggasen, ya akken lebyi amiran d afares n useggs ney sin.
Tese ya iwtet n tsebdut azal n 300 n wussan.

Tabya d tettenehsab d ammad amiran ma nessemgared-itt d yizegzawen niiden, d ayen iy-d-ssebagent kra n tnefkin timazrayin d akken asyar n tabya yettwazree deg tasut tis miraw d tza (19) deg Tefriqt d Marikan, ma deg tmurt n Lezzayer ufan-t tleyamani deg useggs n 1905 deg temdint n Skikda anda it- zzan deg tewrit n Stura, fkan-as isem n RUSSICADA deg useggs n 1994.
Ammad deg Lezzayer azal n : 309,889 n yiqentaren (deg texxamin n plastik).
137,950 n yiqentaren(azra deg iferkwin).

Timnaqin n wammad : S umata yettili deg lwiyat n ugafa n tmurt (Grigel, Tipaza, Lezzayer, Bumerdas, Blida, Msetyanem, Skikda).
Tiwsatin yettwazereen akk di Lezzayer :
Tyuga, Duglas, Čandler, Kamarusa, Silfa, Toudla, Rusikada, Kuntunga.

Tizwal

d agummu yettmaçean i d-yefrurin deg kra tewsatin n yemyan, d-yekkan seg tesmilt n yizeğgigen, ad naf yur-s sin leşnaf, maca isem d yiwen, yiwt d aseklu meqqren ur tesci ari isenmanen, ma tayed yur-s isenmanen, tattali yur-s azal snat Imitrat.
Aglam n imyi : d imyi awyesan d ajungal yur-s isenmanen, taneħbat-is kemmilet, afurek-is yecluleq, deg teyyi yur-s sin Imitrat, ifrawen-is hravit mellul-it, tizeğgigen-is dayen tid mellulen, agummu-ines d ażiegħay d aberkan, igemmū gar isafen.

Abayur-is deg tujiya: Igumma-ines tħmaçean, ifrawen-is xedmen-t i udawi, izem-is yettdawi l-iġor, yettdawi aṭtanen uqemmuc.
Leşnaf i imucaeen: Tizwal tizeggien, d tezwil tibekanin d umarikan.

Taskanin

Fruits

FRASHE

Le genre *Fragaria* regroupe environ une vingtaine d'espèces.
Le Fraisier est une plante vivace, cultivée pour son fruit se propageant par des stolons, son caractère vivace lui permet de survivre sur plusieurs années, bien qu'actuellement la tendance est la production annuelle ou bisannuelle.
Le cycle végétatif dure 300 jours. Par rapport à beaucoup de légumes, le fraisier est une culture relativement récente. Certaines données historiques nous montrent que la fraise de bois était cultivée déjà vers le XIX siècle en Afrique et en Amérique, elle est introduit en Algérie en 1905 par les Italiens au niveau de Skikda, cultivé sur les collines de la zone de Stora, elle fut surnommée RUSSICADA en 1994.
La production en Algérie représente : 309 889 Qx (Sous serre), 137 950 Qx (Plein champ).

Les zones potentielles de production : réparties principalement au niveau des wilayas du nord du pays (Jijel-Tipaza-Alger-Boumerdes-Blida-Mostaganem et Skikda).
Les variétés les plus cultivées en Algérie : Tioga, douglas, Chandler, Camarosa, Selva, Toudla, Russicada, Condonga.

Framboises

Framboises ou mûres (*Rubus*): Un fruit comestible produit par un certain nombre d'espèces végétales du genre Mûres, de la famille rose. La différence entre les framboises et les mûres est que les framboises sont un grand arbre sans épines et les mûres sont un arbuste épineux grimpant et mesurant jusqu'à deux (02) mètres de haut.

Description botanique : Il s'agit d'une plante de buisson sauvage et épineuse avec une tige allongée, une branche tombante jusqu'à une hauteur de deux mètres, ses feuilles sont de forme ovale, combinées avec des fleurs blanches et des fruits rouges et noirs, composés, qui poussent autour des rivières.

Avantages médicinaux : Ses fruits sont mangés et ses feuilles sont utilisées dans les traitements de médecine traditionnelle comme astringent, purificateur et des bouchées juteuses sont utilisées pour la douleur des plaies. Le gargancement est également utile dans le traitement des maladies bucco-dentaires.

Espèces communes : mûres rouges, mûres noires et mûres américaines.

فواكه

خصائص

- الرسم: سعادين قراوي و محمد قطبون
- القيمة: 25 و 50 دج
- حجم الطابع: 35x35 (2x)
- المطبعة: مطبعة السنبلة الجزائرية
- طريقة الطبع: الأفقيات
- الوثيقة الطوابعية: طرف مصور بـ 10.00 دج و يستعمل ختم مصور لل يوم الأول.
- البيع السابق: يوم الأحد 16 و الإثنين 17 ماي 2021 في جميع الفيابات الرئيسية للبريد عبر 48 ولاية.
- البيع الشامل: يوم الثلاثاء 18 ماي 2021 في جميع المراكز البريدية.

Taskanin

05
2021

Characteristics

- Drawing: Smain Karaoui et Mohamed Guettouche
- Facial value: 25 x 50 AD
- Dimensions: 35x35 (x2)
- Printer: Printing House of the Bank of Algeria
- Printing process: Offset
- Philatelic Document: A 1st Day Envelop of 10.00 AD with obliteration 1st Day illustrated.
- 1st Day Sale: Sunday and Monday, on May 16th and 17th, 2021 In the 48 main post offices of the chief towns of each wilaya.
- General Sale: Tuesday on May 18th, 2021. At all post offices.

